

Додаток 2

Шкала коми Глазго

| Компонент | Реакція | Кількість балів |
|---------------------|--|-----------------|
| Моторна реакція (M) | Виконання рухів за командою | 6 |
| | Цілеспрямований рух у відповідь на больове подразнення (здоровшою кінцівкою) | 5 |
| | Відсмикування кінцівки у відповідь на больове подразнення | 4 |
| | Патологічне згинання у відповідь на больове подразнення (декортикація) | 3 |
| | Патологічне розгинання у відповідь на больове подразнення (децеребрація) | 2 |
| | Відсутність рухів (м'явість кінцівки) | 1 |
| | Діапазон | 1-6 |
| | Довільне | 4 |
| | Як реакція на вербальний стимул | 3 |
| | Як реакція на больове подразнення | 2 |
| Відкриття очей (E) | Відсутне | 1 |
| | Діапазон | 1-4 |
| | Пацієнт орієнтований і відповідає на запитання | 5 |
| | Пацієнт дезорієнтований і говорить плутано | 4 |
| Мовна реакція (V) | Словесна "мішанина", смисл якої не відповідає запитанню | 3 |
| | Незрозумілі звуки | 2 |
| | Відсутність мови | 1 |
| | Діапазон | 1-5 |
| | ЗАГАЛОМ | 3-15 |

Примітка: Бали Шкали коми Глазго в інтубованих пацієнтів позначаються літерою "Т," із максимальним балом 11Т (напр., E4M6V1).

